

## Eriobotrya japonica (Japanse wolmispel - nispero - loquat - neffel)


potmaat □ 19,5 cm (= 7,5 l → 1,00 m hoogte plant)

Deze zuiderse plant doet het bij ons, door de klimaatverandering, steeds beter. Je kan hem, wat standplaats betreft, het best vergelijken met een vijg. Hij kan als kuipplant prima en is ook perfect in te snoeien. In een sierpot laat je hem best in koude serre overwinteren, of in je afgeschermd wintertuin. Dan geniet je nog eens extra van zijn heerlijke bloemgeur. Vaak vanaf half december. Zelf bevruchten met een penseel kan, om vruchtvorming te bevorderen. In de tuin planten in volle grond kan natuurlijk ook. Dan liefst het warmste hoekje van je tuin, tegen een zuidmuur, in een goed doorlatende, licht kalkrijke grond. De stevige groene bladeren zijn bovendien te gebruiken om gezonde thee van te maken, met een licht ontstekingsremmende werking. Verwijder hiervoor het wolachtige laagje aan de boven en onderzijde van het blad.


De wilde Eriobotrya japonica zie je vaak te koop aangeboden. Een mooie sterk groeiende struik. Maar bloemvorming, of vruchten laten vaak erg lang op zich wachten. Soms 10 tot 15 jaar.

**Onze veredelde variëteiten** zullen vaak **na 3 jaar al bloemknoppen** geven. En onder de juiste omstandigheden ook heerlijke vruchten. De geel oranje vruchten zijn eivormig en super sappig als ze rijp zijn. De smaak is vergelijkbaar met een abrikoos. De grote pitten zijn niet eetbaar.


Heden hebben wij ook twee bijzondere bontbladige variëteiten beschikbaar: de geelbonte variëteit '**Okan**' en de witbonte variëteit '**Variegata**'. Deze twee variëteiten laten zich moeilijk vermeerderen waardoor het aanbod nog zeer beperkt is.




**'Argelina'** bloem: wit, sterk geurend  
kenmerken: compacte, opgaande groei  
bloeitijd: december-januari oogst: mei-juni



**'Golden Nugget'** bloem: wit, sterk geurend, losse bloemtrossen  
kenmerken: compacte opgaande groei, ronde vruchten  
bloeitijd: december-januari oogst: mei-juni





**Eriobotrya japonica**  
**'Rose-Anne'**

**'Rose-Anne'** bloem: wit, sterk geurend, compacte bloemen  
kenmerken: breed uitgroeie plant, ovale vruchten  
bloeitijd: december-januari oogst: mei-juni



**'Rose-Anne'**




**Eriobotrya deflexa**

**'Deflexa'** bloem: wit, geurend  
kenmerken: bronskleurige jonge twijgen, sierplant (geeft geen vrucht)  
bloeitijd: december-januari



**x Rhapsibotrya jap.**  
**'Coppertone'**

**'Coppertone'** bloem: wit, licht roze fijne bloemen, geurend  
kenmerken: kleine struik met bronskleurige jonge twijgen, sierplant (geeft geen vrucht)  
bloeitijd: december-januari







**'Okan'**

bloem: wit, sterk geurend  
kenmerken: bont blad, heldergroen-geel  
bloeitijd: december-januari



**'Variegata'**

bloem: wit, sterk geurend  
kenmerken: bont blad, zachtgroen-wit  
bloeitijd: december-januari